



ESTRATTO DI LIEVITO *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*



- 💧 **Ricco** di vitamine e aminoacidi liberi
- 💧 **Stimola** il metabolismo della pianta
- 💧 **Favorisce** l'accrescimento del frutto e migliora la produzione finale
- 💧 **Migliora** i parametri qualitativi e le caratteristiche organolettiche del frutto (colore, calibro e compattezza)
- 💧 **Compatibile** con i prodotti fitosanitari



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

MECCANISMO D'AZIONE

MOKA è un biostimolante il cui impiego, a partire dalla fase di allegagione dei frutti, stimola:

- la divisione e l'espansione cellulare, favorendo l'accrescimento del frutto;
- lo sviluppo vegetativo della pianta, la biosintesi della clorofilla e degli acidi nucleici.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

MOKA è utilizzato in coltivazioni all'aperto e in serra, con applicazione fogliare.

COLTURE	Dosi	Numero di applicazioni	Tipo di applicazioni	Momento di applicazione
ORTICOLE Solanacee (pomodori, melanzane, peperoni) Cucurbitacee (zucchine, meloni, zucca, cetrioli)	1-2 L/ha	da 2 a 6	Fogliare	Prefioritura fino al raccolto
COLTURE A FOGLIA (lattuga, spinacio)		da 1 a 3		Dopo il trapianto fino al raccolto
FRUTTI ROSSI (fragole, mirtilli)		da 1 a 4		Prefioritura fino al raccolto
UVA DA VINO, DA TAVOLA		da 1 a 2		Inizio allegagione fino alla maturazione del frutto
ARBORICOLTURA Olivi, Agrumi (limone, arancia, mandarino), Frutta a nocciolo (pesca, nettarina, ciliegia, prugna, albicocca, Regina Claudia), Frutta a semi (mela, pera), Frutta a guscio (noce, mandorle, nocciolo)		da 1 a 2		Inizio allegagione fino alla maturazione del frutto
BANANE		da 1 a 3		Inizio allegagione fino alla maturazione del frutto
PATATE		da 1 a 4		Ogni 10-15 giorni dall'inizio della crescita dei tuberi
CIPOLLE		da 1 a 4		Da 5 foglie fino alla fine della crescita del bulbo
BARBABIETOLA ROSSA		da 1 a 2		Ogni 10-15 giorni dall'inizio della crescita della radice
CEREALI (FRUMENTO, ORZO)		1		Inizio antesi fino a riempimento dei chicchi
LEGUMINOSE (fagioli, piselli, lenticchie, soia)		da 1 a 2		Piena fioritura fino all'inizio della maturazione
ERBA MEDICA		da 1 a 4		Da 7 a 15 giorni prima di ogni taglio
PRATO	1-4 L/ha	da 1 a 8		Dopo il taglio, ogni 7-15 giorni

CONTENUTO DICHIARATO:

AZOTO (N) TOTALE	5,8 % p/p
AZOTO (N) ORGANICO	5,6 % p/p
pH	4,8
AMINOACIDI LIBERI Ottenuti mediante fermentazione utilizzando il microorganismo <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	20,0 % p/p

I costituenti del **MOKA** sono inclusi negli allegati del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica, prima del suo impiego consultare il proprio Organismo di Controllo.



Tanica 5 L

CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER